

Pág.	Onde se lê	Foi atualizado para	
82	<ul style="list-style-type: none"> Hepatite aguda ou doença (...) 	<ul style="list-style-type: none"> Gravidez Hepatite aguda ou doença (...) 	
82	<ul style="list-style-type: none"> 400 mg – 50-100 ml NaCl 0,9%; D5%H₂O 	<ul style="list-style-type: none"> 400 mg – 100 ml 800 mg – 250 ml NaCl 0,9%; D5%H₂O 	
126	<ul style="list-style-type: none"> Hipotensão 	<ul style="list-style-type: none"> Hipotensão grave 	
126	Solução injetável – 10 mg/10 ml; 50 mg/50 ml	Solução injetável – 10 mg/10 ml	
126	EV - Perfusão	EV - Direta	EV - Perfusão
126	Solução pronta	Solução pronta	Solução pronta
126	<ul style="list-style-type: none"> 10 mg - 100 ml 50 mg - 500 ml NaCl 0,9%; D5%H₂O 	-	<ul style="list-style-type: none"> 50 mg - 500 ml NaCl 0,9%; D5%H₂O
126	10-100 ml/h	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar velocidade à necessidade Recomendação: 2-6 mg/h Máximo recomendado: 10 mg/h 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar velocidade à necessidade Recomendação: 2-10 mg/h
126	24 h após diluição	Utilização imediata	24 h após diluição
126	<ul style="list-style-type: none"> Deverá ser diluído imediatamente após abertura 	<ul style="list-style-type: none"> Deve utilizar-se seringa perfusora para controlo rigoroso da dose a administrar 	
126	<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar os sinais vitais durante e após a administração 	<ul style="list-style-type: none"> Vigiar permanentemente os sinais vitais durante e após a administração 	